

医療用麻薬(徐放性製剤)を服用する際の注意点

- 錠剤やカプセル剤を嚙んだり、砕いたりしない。
 - ・お薬はゆっくり溶けて吸収され、徐々に効果が現れます。飲めないからといって嚙んだり、砕いたりしてしまうと、お薬が早く溶け出し急激に効果が出る可能性があります。
- 決められた時間に飲む。
 - ・定期的に決められた時間に飲むことで、痛みを予防していきます。
 - ・痛みがおさまらない場合は、追加薬(レスキュー)を我慢しないで使ってください。
- 副作用は正しく対応すれば大丈夫。
 - ・主に、「便秘」「吐き気」「眠気」が挙げられますが、薬によって出方が異なります。
 - ・必ずしも、全員に現れるわけではありません。
 - ・吐き気や眠気は時間の経過とともに落ち着いていきます。
 - ・便秘は下剤を併用することでコントロールしていきます。

代表的な徐放性製剤

- ・オキシコンチンTR錠(5mg・10mg・20mg・40mg)
 - ・タペンタ錠(25mg・50mg・100mg)
 - ・ナルサス錠(2mg・6mg・12mg・24mg)
- ☆他にも徐放性製剤は多数存在します。
☆薬によって飲み方や効き方が異なりますので、必ず薬剤師の説明を受けてから服用してください。

痛みをとりながら、副作用も予防していくことが大切です。
皆さまが安心してお薬を服用できるように、
私たち薬剤師が責任をもってサポート致します。

薬局名

福島薬剤師会
地域包括ケアシステム推進委員会